

カメムシ予察 発生状況

<浦臼町営農対策協議会>

調査期間:令和6年7月19日～令和6年7月25日

調査日:令和6年7月25日

〈 水 田 〉				
調査定点 12		カメムシ頭数 ※フェロモントラップによる捕獲頭数		備考
定点番号	農事組合	1週間累計 捕獲頭数	1日当たりの 平均捕獲頭数	
①	鶴沼第1	1	0.14	
②	鶴沼第2	10	1.43	
③	鶴沼第3	2	0.29	
④	浦臼第1	1	0.14	
⑤	浦臼第2	5	0.71	
⑥	浦臼6草原	17	2.43	
⑦	浦臼第7	5	0.71	
⑧	浦臼第8A	3	0.43	
⑨	浦臼第8B	18	2.57	
⑩	晩生内第1	2	0.29	
⑪	晩生内第3A	11	1.57	
⑫	晩生内第3B	5	0.71	
平均値		6.7	1.0	

～防除の基準～

1週間累計の捕獲頭数が1.2頭以上(ななつぼし等、割粃の少ない品種は2.2頭以上)となったら、追加防除を行った方がよいとされています。

※性誘引フェロモントラップにより上記調査期間(1週間程度)で捕獲したカメムシの頭数をホームページに公開しています。